

落实安全责任 推动安全发展

烟花爆竹燃放旺季到来

昌吉市公安局加大检查力度保安全

警方提醒:购买正规合格的烟花爆竹产品,依法文明安全燃放

本报讯 记者廖冬云、通讯员曾志疆报道:随着春节日益临近,烟花爆竹运输、燃放进入旺季,为严防各类事故发生,全力维护公共安全和社会治安大局稳定,1月4日,昌吉市公安局治安管理大队组织民警对辖区烟花爆竹零售点进行了安全大检查。

检查中,民警重点对烟花爆竹零售点的营业证件是否齐全,经营范围是否符合规定,烟花爆竹的进货渠道是否合法,储存数量、存放方式是否规范,是否存在储存、销售超标、伪劣、假冒烟花爆竹产品以及消防安全管理是否符合要求、消防器材是否完备等方面进行了检查。民警要求烟花爆竹经营业主必须提高警惕,切实保障烟花爆竹运输销售等环节安全。

昌吉市国华花炮经销店负责人云霞告诉记者:“烟花爆竹销售高峰即将到来,我们店内共有42个品种烟花和6个品种的鞭炮供消费者选购。我们会严格按照相关部门的要求,规范烟花爆竹销售点经营秩序,消除安全隐患,营造安全祥和的社会环境。”

下一步,昌吉市公安局治安管理大队将继续加大对烟花爆竹的检查整治,常态化推进治安清查、安全排查、防范宣传等工作,切实保证安全隐患排查全覆盖,将安全隐患消除在萌芽状态。

为有效预防和减少燃放烟花爆竹引发的事故,确保群众度过欢乐祥和的春节,昌吉市公安局提醒市民,购买正规合格的烟花爆竹产品,依法文明安全燃放。

- 1.不得将烟花爆竹向人员、车辆、建



1月4日,昌吉市公安局治安管理大队民警正在烟花爆竹销售点检查。

本报记者 廖冬云 摄

- 2.不得妨碍行人、车辆安全通行和影响交通秩序;
 - 3.不得在人员密集的公共场所燃放烟花爆竹;
 - 4.不得在房屋室内及公共走廊、楼梯、屋顶、阳台、窗口燃放烟花爆竹;
 - 5.不得采用其他危害公共安全和人身、财产安全的方式燃放烟花爆竹。
- 对非法生产、经营、运输、储存、燃放烟花爆竹的单位和个人,公安机关将依照法律、法规规定予以处罚。构成违反治安管理行为的,依法给予治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

昌吉州消防救援支队开展“六熟悉”演练工作

掌握小区布局情况 提升灭火救援能力



1月4日,州消防救援支队组织辖区消防救援站消防员对昌吉市海棠壹号院小区开展“六熟悉”演练工作。

刘臣 摄

本报讯 通讯员刁慕晨、刘臣报道:为扎实做好辖区灭火救援工作,进一步提升消防救援队伍灭火救援攻坚能力,1月4日,昌吉州消防救援支队组织辖区

世纪大道特勤站、昌吉市屯河路政府专职消防救援站对昌吉市海棠壹号院小区开展“六熟悉”演练工作,全面掌握小区内部建筑结构以及消防设施运

行情况,为灭火救援工作打下坚实基础。

当天20时许,昌吉州消防救援支队组织辖区2个消防救援站在海棠壹号院小区对消防车通道通行情况进行测试,对小区室外消火栓、高层小区的30层最高处室内消火栓进行了出水测试,在物业工作人员的带领下对高层建筑的建筑结构以及小区布局等情况进行了解,对小区内消防控制室、水泵房、配电室等重点部位进行了熟悉,对相关消防设施、设备的运行进行了检查,对小区的实际情况有了更全面的掌握。

期间,昌吉州消防救援支队全勤指挥部设置高层建筑11层火灾,消防救援人员立即开展高层居民楼灭火救援拉动演练。本次演练全面检验了消防救援队伍处置高层建筑火灾的实战能力。

据了解,为充分抓好冬季岗位大练兵活动,开展好实战、实训练兵工作,入冬以来,昌吉州消防救援支队已组织全州基层队伍对辖区514家高层建筑、人员密集场所、老旧小区、工业园区等场所开展消防安全“六熟悉”演练工作,全面摸排、准确把握建筑结构、消防设施、安全风险和消防水源、消防车通道等情况,并结合不同场所特别开展无预案拉动演练工作,进一步夯实灭火救援战备基础工作,提升消防救援人员的灭火救援能力。

辟谣



警惕! 应对发热的常见误区

近期不少网友分享了自己发热后的降温方法。虽然有些经验之谈确实有效,但依然存在不少误区,不科学降温可能引发其他问题。因此,上海市第十人民医院中医整合医学科住院医师严辰针对常见发热降温误区提出相应的解决方法,希望能帮助市民避免“踩雷”,安度特殊时期。

误区:阳了还没发热,提前吃药“压制”

真相:在没有发热,仅有咳嗽、咽痛、流涕感冒症状时,提前服用退热药,不仅可能会掩盖真实病情,还有可能在真正发热时,造成药物过量的问题,损害肝肾功能,值得引起警惕。

分析:现在并不存在明确降低新冠病毒感染率的药物,无论是退热药、中成药或其他感冒药,都不能通过提前用药来预防感染。

正确做法

在体温超过38.5℃时,按说明书要求正确服用退热药,不可过量服用、叠加服用、缩短用药间隔多次服用,或和含有退热西药成分的中成药同时服用。

误区:对着阳性发热者周围环境喷洒酒精

真相:最近,由于新冠病毒感染者大多选择居家康复,许多人使用消毒剂在家中消毒,但对发热者周围环境喷洒酒精,不仅浓度过低,达不到消毒效果,发热者吸入后还会引起刺激性咳嗽,甚至破坏气道上皮细胞。

分析:室内空气主要应当通过开窗通风来进行置换,应当避免不均匀喷洒消毒剂,开窗通风每日2-3次,每次30分钟以上。

正确方法

选用消毒湿巾、棉布等,以低腐蚀、刺激性小的消毒剂进行消毒,尽量采用擦、拖等方法,消毒人员应当正确佩戴口罩,做好个人防护,必要时也可使用紫外灯照射消毒。

误区:退热药一吃,立即复测体温

真相:退热药并非一吃下去就会立即退热,起效一般需要至少半小时。

分析:退热药起效后,一般体温可以下降1-1.5℃,而非直接降至正常,一般来说,退热药持续作用时间为4-8小时,缓释片为12小时,药效过了,体温还是可能继续上升,服用退热药的目的主要是缓解发热带来的不适,并不能根除疾病。

正确做法

服用退热药后至少观察30分钟再复测体温。

误区:一人发热,同住人立即放弃所有防护

真相:作为新冠病毒感染者的同住人,做好防护,依然有意义!

分析:新冠病毒感染者的同住人,由于长期生活在一个屋檐下,部分人认为自己作为密接必然“中招”,因此在家中,出于“摆烂”心理,不戴口罩,不分房间活动,不做消毒工作。

正确做法

新冠病毒感染者的同住人应做到以下五点:

- 1.及时接种新冠疫苗加强针;
- 2.戴口罩,勤通风,常洗手;
- 3.无接触传递物品和餐食;
- 4.合理清洁消毒;
- 5.正确处理阳性者的生活垃圾

来源:央广网